



Folkhälsomyndigheten

Indikatorbeskrivning

Dödlighet i alkoholindex

Datum: 2025-09-22

Indikatoruppgifter

Indikatornamn: Dödlighet i alkoholindex
Indikatoransvarig myndighet/organisation: Socialstyrelsen
Indikatortyp: Utfallsindikator
Redovisningsnivå: Riket, Län

Källa

Namn på undersökning: Dödsorsaksregistret
Ansvarig myndighet/organisation: Socialstyrelsen

Beskrivning av register/undersökning:

Till och med 2011 omfattar dödsorsaksregistret alla avlidna personer som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om själva dödsfallet inträffade inom eller utom landet. Från och med 2012 ingår samtliga dödsfall som inträffat i Sverige i registret, samt de där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. I registret ingår inte dödfödda. I indikatorn inkluderas endast dödsfall där personen var folkbokförd i Sverige vid tiden för dödsfallet. Från och med statistikåret 2012 rättas dödsorsaksregistret upp med sent inkomna dödsorsaksintyg, detta innebär att nya siffror kan skilja något från tidigare rapporterade uppgifter.

Metodbeskrivning

Indikatordefinition:

Antal dödsfall med explicit alkoholdiagnos (ICD-10: E24.4, F10, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, T51, Y90.1–Y90.9, Y91.1–Y91.9, Z50.2, Z71.4 eller Z72.1) som underliggande eller bidragande dödsorsak per 100 000 invånare 15 år eller äldre. För en mer utförlig beskrivning av indikatorn se 'Indikatorbeskrivning'.

Specifisering av variabler:

Alkoholindex Underliggande dödsorsak: den sjukdom eller skadeorsak som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade

den dödliga skadan.

Bidragande dödsorsak: om dödsorsaken inte är underliggande kallas den för bidragande dödsorsak.

Diagnos: diagnoser enligt ICD-10 Denna indikator inkluderar diagnoskoderna E24.4, F10, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, T51, Y90.1-Y90.9, Y91.1-Y91.9, Z50.2 och Z71.4, vilka specificeras nedan:

E24.4 – alkoholutlöst pseudocushingsyndrom F10 – psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser G31.2 – degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol G62.1 – alkoholutlöst polyneuropati G72.1 – alkoholutlöst myopati I42.6 – alkoholkardiomyopati K29.2 – gastrit orsakad av alkohol K70 – leversjukdom orsakad av alkohol K85.2 – alkoholutlöst akut pankreatit K86.0 – kronisk pankreatit orsakad av alkohol O35.4 – vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret på grund av alkoholmissbruk hos modern P04.3 – foster och nyfödd som påverkats av alkoholbruk hos modern Q86.0 – fetalt alkoholsyndrom T51 – toxisk effekt av alkohol Y90.1–Y90.9 – tecken på alkoholpåverkan fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt Y91.1–Y91.9 – tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad Z50.2–Z50.2 – rehabilitering av alkoholmissbrukare Z71.4 – rådgivning och kontroll vid alkoholmissbruk.

ICD står för International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems och ICD-10 är en internationell sjukdomsklassifikation bestående av diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker med syfte att möjliggöra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen går under beteckningen ICD-10-SE.

Se Socialstyrelsens hemsida för mer information om diagnoskoder (ICD-10): <https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/icd-10/>

Beskrivning av beräkning:

Täljare: Antal döda med explicit alkoholdiagnos på dödsorsaksintyget som underliggande eller bidragande dödsorsak i åldern 15 år eller äldre. Nämnare: Medelbefolkningen i åldern 15 år eller äldre under 2021. Kvoten multipliceras med 100 000.

Siffrorna är åldersstandardiserade med rikets medelbefolkning 2021 som standardpopulation. Indikatorn redovisas per år och län (efter den avlidnes folkbokföringsort vid dödstillfället) samt över kön och åldersgrupper.

2016 - beslut om redovisning på kommunnivå Data på kommunnivå redovisas inte på grund av att antalet fall är för få (i många fall 0). Även data på aggregerad nivå med tidsintervaller på flera år innebär små tal och svårtolkade resultat. Redovisning av få observationer kan även medföra en ökad risk för bakvägsidentifiering. Därför redovisas denna indikator endast på riks- och länsnivå.

Svarsfrekvens:

Bortfallet för dödsorsaker i dödsorsaksregistret är ca 1 % per år.

Jämförbarhet över tid

Indikatorn är jämförbar över tid.