



Folkhälsomyndigheten

Indikatorbeskrivning

Dödlighet i alkoholspecifika leversjukdomar

Datum: 2025-09-22

Indikatoruppgifter

Indikatornamn: Dödlighet i alkoholspecifika leversjukdomar
Indikatoransvarig myndighet/organisation: Socialstyrelsen
Indikatortyp: Utfallsindikator
Redovisningsnivå: Riket, Län

Källa

Namn på undersökning: Dödsorsaksregistret
Ansvarig myndighet/organisation: Socialstyrelsen

Beskrivning av register/undersökning:

Till och med 2011 omfattar dödsorsaksregistret alla avlidna personer som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om själva dödsfallet inträffade inom eller utom landet. Från och med 2012 ingår samtliga dödsfall som inträffat i Sverige i registret, samt de där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. I registret ingår inte dödfödda. I indikatorn inkluderas endast dödsfall där personen var folkbokförd i Sverige vid tiden för dödsfallet. Från och med statistikåret 2012 rättas dödsorsaksregistret upp med sent inkomna dödsorsaksintyg, detta innebär att nya siffror kan skilja något från tidigare rapporterade uppgifter.

Metodbeskrivning

Indikatordefinition:

Antal dödsfall med diagnosen leversjukdom orsakad av alkohol (ICD-10: K70) som underliggande eller bidragande dödsorsak per 100 000 invånare 15 år eller äldre. För en mer utförlig beskrivning av indikatorn se 'Indikatorbeskrivning'.

Specifisering av variabler:

Alkoholspecifika leversjukdomar Underliggande dödsorsak: den sjukdom eller skadeorsak som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen

som framkallade den dödliga skadan.

Bidragande dödsorsak: om dödsorsaken inte är underliggande kallas den för bidragande dödsorsak.

Diagnos: diagnoser enligt ICD-10 Denna indikator inkluderar diagnoskod K70, vilken specificeras nedan:

K70 – leversjukdom orsakad av alkohol K70.0 – alkoholfettlever K70.1 – alkoholhepatit K70.2 – leverfibros och leverskleros orsakad av alkohol K70.3 – levercirros orsakad av alkohol K70.4 – leversvikt orsakad av alkohol K70.9 – leversjukdom orsakad av alkohol, ospecificerad.

ICD står för International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems och ICD-10 är en internationell sjukdomsklassifikation bestående av diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker med syfte att möjliggöra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen går under beteckningen ICD-10-SE.

Se Socialstyrelsens hemsida för mer information om diagnoskoder (ICD-10): <https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/icd-10/>

Beskrivning av beräkning:

Täljare: Antal döda med diagnosen leversjukdom orsakad av alkohol som underliggande eller bidragande dödsorsak i åldern 15 år eller äldre. Nämnare: Medelbefolkningen i åldern 15 år eller äldre under 2021. Kvoten multipliceras med 100 000.

Siffrorna är åldersstandardiserade med rikets medelbefolkning 2021 som standardpopulation. Indikatorn redovisas per år och län (efter den avlidnes folkbokföringsort vid dödstillfället) samt över kön och åldersgrupper.

2016 - beslut om redovisning på kommunnivå Data på kommunnivå redovisas inte på grund av att antalet fall är för få (i många fall 0). Även data på aggregerad nivå med tidsintervaller på flera år innebär små tal och svårtolkade resultat. Redovisning av få observationer kan även medföra en ökad risk för bakvägsidentifiering. Därför redovisas denna indikator endast på riks- och länsnivå.

Svarsfrekvens:

Bortfallet för dödsorsaker i dödsorsaksregistret är ca 1 % per år.

Jämförbarhet över tid

Indikatorn är jämförbar över tid.