Folkhälsomyndigheten

Indikatorbeskrivning

Vårdade, alkoholförgiftning

Datum: 2025-07-14

Indikatoruppgifter

Indikatornamn:	Vårdade, alkoholförgiftning
Indikatoransvarig myndighet/organisation:	Socialstyrelsen
Indikatortyp:	Utfallsindikator
Redovisningsnivå:	Riket, Län

Källa

Namn på undersökning:	Patientregistret
Ansvarig myndighet/organisation:	Socialstyrelsen

Beskrivning av register/undersökning:

Patientregistret innehåller: – alla avslutade vårdtillfällen i sluten vård – uppgifter om patienter som varit inlagda på sjukhus i den geriatriska och psykiatriska vården – uppgifter om patienter som behandlats av läkare i den delen av den öppna vården som inte är primärvård – diagnoser och åtgärder för patienter som vårdats i psykiatrisk tvångsvård enligt LPT eller LRV.

Patientregistret innehåller inte: – uppgifter om primärvård – uppgifter om andra yrkesgrupper än läkare.

Metodbeskrivning

Indikatordefinition:

Antal vårdade patienter enligt patientregistret (slutenvård respektive slutenvård och/eller specialiserad öppenvård) med alkoholförgiftning (ICD-10: F10.0 respektive T51) som huvud- eller bidiagnos per 100 000 invånare 15 år och äldre. Indikatorn redovisas per kalenderår på riks- och länsnivå samt efter kön och åldersgrupp. För en mer utförlig beskrivning av indikatorn, se 'Indikatorbeskrivning'.

Specificering av variabler:

Alkoholförgiftning Diagnoser enligt ICD-10. Denna indikator inkluderar diagnoskoderna F10.0 och T51, vilka specificeras nedan:

F10.0 – akut intoxikation T51 – toxisk effekt av alkohol T51.0 – etanol T51.1 – metanol T51.2 – 2-propanol T51.3 – finkelolja T51.8 – andra specificerade alkoholer T51.9 – alkohol ospecificerad.

ICD står för International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems och ICD-10 är en internationell sjukdomsklassifikation bestående av diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker med syfte att möjliggöra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen går under beteckningen ICD-10-SE.

Se Socialstyrelsens hemsida för mer information om diagnoskoder (ICD-10): https://www.socialstyrelsen.se /utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/icd-10/

Beskrivning av beräkning:

Segment: Slutenvård Täljare: Antal vårdade patienter enligt patientregistret (slutenvård) med alkoholförgiftning som huvud- eller bidiagnos. Nämnare: Medelbefolkningen 15 år och äldre under 2021. Kvoten multipliceras med 100 000.

Segment: Sluten- och/eller specialiserad öppenvård Täljare: Antal vårdade patienter enligt patientregistret (sluten- och/eller öppenvård) med alkoholförgiftning som huvud- eller bidiagnos. Nämnare: Medelbefolkningen 15 år och äldre under 2021. Kvoten multipliceras med 100 000.

Statistiken är åldersstandardiserad med rikets medelbefolkning 2021 som standardpopulation. Indikatorn redovisas per kalenderår på riks- och länsnivå (län efter patientens folkbokföringsort vid första vårdtillfället med aktuell diagnos) samt efter kön och åldersgrupp.

Svarsfrekvens:

Patientregistret Den årliga underrapporteringen under de senaste åren uppskattas till mindre än 1 % beträffande somatisk slutenvård. Personnumret saknas eller är felaktigt för knappt 1 % av vårdtillfällena de senaste åren, varav merparten avser barn eller utomlands boende. Huvuddiagnos saknas för cirka 1 % av vårdtillfällena. Uppgift om yttre orsak saknas sedan år 2006 för omkring 3 % av vårdtillfällena. Variabler som sjukhus, klinik, kön, ålder, in- och utskrivningsdatum är så gott som kompletta.

Jämförbarhet över tid

Indikatorn är jämförbar över tid.

Segmentet Slutenvård redovisas från och med år 2000 medan segmentet Sluten- och/eller specialiserad öppenvård redovisas först från och med år 2006.

Observera att nollor (0) redovisas för segmentet Sluten- och/eller specialiserad öppenvård för åldersgruppen 16–84 år under åren 2000–2005. Dessa värden ska betraktas som missing.