



Folkhälsomyndigheten

Indikatorbeskrivning

Vårdade, återinskrivning alkoholdiagnoser

Datum: 2025-07-14

Indikatoruppgifter

Indikatornamn: Vårdade, återinskrivning alkoholdiagnoser
Indikatoransvarig myndighet/organisation: Socialstyrelsen
Indikatortyp: Utfallsindikator
Redovisningsnivå: Riket, Län

Källa

Namn på undersökning: Patientregistret
Ansvarig myndighet/organisation: Socialstyrelsen

Beskrivning av register/undersökning:

Patientregistret innehåller: – alla avslutade vårdtillfällen i slutenvård – uppgifter om patienter som varit inlagda på sjukhus i den geriatrika och psykiatriska vården – uppgifter om patienter som behandlats av läkare i den delen av den öppna vården som inte är primärvård – diagnoser och åtgärder för patienter som vårdats i psykiatrisk tvångsvård enligt LPT eller LRV.

Patientregistret innehåller inte: – uppgifter om primärvård – uppgifter om andra yrkesgrupper än läkare.

Metodbeskrivning

Indikatordefinition:

Andel (%) patienter som vårdats för alkoholdiagnos (huvud- eller bidiagnos) enligt patientregistret (slutenvård) som återinskrivits med alkoholdiagnos samma kalenderår (ICD-10: E24.4, F10, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, T51, Y90.1–Y90.9, Y91.1–Y91.9, Z50.2, Z71.4, Z72.1) bland personer 15 år och äldre. Indikatorn redovisas per kalenderår på riks- och länsnivå samt efter kön och åldersgrupp. För en mer utförlig beskrivning av indikatorn, se 'Indikatorbeskrivning'.

Specifisering av variabler:

Återinskrivning alkoholdiagnoser Diagnoser enligt ICD-10. Denna indikator inkluderar diagnoskoderna E24.4, F10, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, T51, Y90.1–Y90.9, Y91.1–Y91.9, Z50.2, Z71.4 respektive Z72.1, vilka specificeras nedan:

E24.4 – alkoholutlöst pseudocushingsyndrom F10 – psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser G31.2 – degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol G62.1 – alkoholutlöst polyneuropati G72.1 – alkoholutlöst myopati I42.6 – alkoholkardiomyopati K29.2 – gastrit orsakad av alkohol K70 – leversjukdom orsakad av alkohol K85.2 – alkoholutlöst akut pankreatit K86.0 – kronisk pankreatit orsakad av alkohol O35.4 – vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret på grund av alkoholmissbruk hos modern P04.3 – foster och nyfödd som påverkats av alkoholbruk hos modern Q86.0 – fetalt alkoholsyndrom T51 – toxisk effekt av alkohol Y90.1–Y90.9 – tecken på alkoholpåverkan fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt Y91.1–Y91.9 – tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad Z50.2 – Z50.2 – rehabilitering av alkoholmissbrukare Z71.4 – rådgivning och kontroll vid alkoholmissbruk Z72.1 – alkoholbruk.

ICD står för International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems och ICD-10 är en internationell sjukdomsklassifikation bestående av diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker med syfte att möjliggöra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen går under beteckningen ICD-10-SE.

Se Socialstyrelsens hemsida för mer information om diagnoskoder (ICD-10): <https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/icd-10/>

Beskrivning av beräkning:

Täljare: Antal patienter med minst två vårdtillfällen i slutenvård under samma kalenderår med minst en av aktuella diagnoser som huvud- eller bidiagnos. Nämnare: Antal patienter med minst ett vårdtillfälle i slutenvård med minst en av aktuella diagnoser som huvud- eller bidiagnos.

På länsnivå är antalet patienter med aktuell diagnos få för vissa ålders- och könsgupper. I dessa fall ger en förändring med en patient med minst två vårdtillfällen i slutenvård under samma kalenderår med minst en av aktuella diagnoser som huvud- eller bidiagnos en stor procentuell skillnad (kvoter är känsliga för små förändringar i täljaren när nämnaren utgörs av ett litet tal). På grund av detta redovisas inte några siffror i de fall där nämnaren understiger 20 patienter.

Indikatorn redovisas per kalenderår på riks- och länsnivå (län efter patientens folkbokföringsort vid första vårdtillfället med aktuell diagnos) samt efter kön och åldersgrupp.

Svarsfrekvens:

Patientregistret Den årliga underrapporteringen under de senaste åren uppskattas till mindre än 1 % beträffande somatisk slutenvård. Personnumret saknas eller är felaktigt för knappt 1 % av vårdtillfällena de senaste åren, varav merparten avser barn eller utomlands boende. Huvuddiagnos saknas för cirka 1 % av vårdtillfällena. Uppgift om yttre orsak saknas sedan år 2006 för omkring 3 % av vårdtillfällena. Variabler som sjukhus, klinik, kön, ålder, in- och utskrivningsdatum är så gott som kompletta.

Jämförbarhet över tid

Indikatorn är jämförbar över tid.