



Folkhälsomyndigheten

## Indikatorbeskrivning

Vårdade, alkoholspecifika leversjukdomar

Datum: 2025-07-14

### Indikatoruppgifter

|  |  |
|--|--|
| <b>Indikatornamn:</b>                            | Vårdade, alkoholspecifika leversjukdomar |
| <b>Indikatoransvarig myndighet/organisation:</b> | Socialstyrelsen                          |
| <b>Indikatortyp:</b>                             | Utfallsindikator                         |
| <b>Redovisningsnivå:</b>                         | Riket, Län                               |

### Källa

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Namn på undersökning:</b>            | Patientregistret |
| <b>Ansvarig myndighet/organisation:</b> | Socialstyrelsen  |

### Beskrivning av register/undersökning:

Patientregistret innehåller: – alla avslutade vårdtillfällen i slutenvård – uppgifter om patienter som varit inlagda på sjukhus i den geriatrika och psykiatriska vården – uppgifter om patienter som behandlats av läkare i den delen av den öppna vården som inte är primärvård – diagnoser och åtgärder för patienter som vårdats i psykiatrisk tvångsvård enligt LPT eller LRV.

Patientregistret innehåller inte: – uppgifter om primärvård – uppgifter om andra yrkesgrupper än läkare.

## Metodbeskrivning

### Indikatordefinition:

Antal vårdade patienter enligt patientregistret (slutenvård respektive sluten- och/eller specialiserad öppenvård) med alkoholspecifik leversjukdom (ICD-10: K70) som huvuddiagnos per 100 000 invånare 15 år och äldre. Indikatorn redovisas per kalenderår på riks- och länsnivå samt efter kön och åldersgrupp. För en mer utförlig beskrivning av indikatorn, se 'Indikatorbeskrivning'.

### Specifisering av variabler:

Alkoholspecifika leversjukdomar Diagnoser enligt ICD-10. Denna indikator inkluderar diagnoskod K70, vilken specificeras nedan:

K70 – leversjukdom orsakad av alkohol K70.0 – alkoholfettlever K70.1 – alkoholhepatit K70.2 – leverfibros och leverskleros orsakad av alkohol K70.3 – levercirros orsakad av alkohol K70.4 – leversvikt orsakad av alkohol K70.9 – leversjukdom orsakad av alkohol, ospecificerad.

ICD står för International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems och ICD-10 är en internationell sjukdomsklassifikation bestående av diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker med syfte att möjliggöra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen går under beteckningen ICD-10-SE.

Se Socialstyrelsens hemsida för mer information om diagnoskoder (ICD-10): <https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/icd-10/>

### **Beskrivning av beräkning:**

Segment: Slutenvård Täljare: Antal vårdade patienter enligt patientregistret (slutenvård) alkoholspecifik leversjukdom som huvuddiagnos. Nämnare: Medelbefolkningen 15 år och äldre under 2021. Kvoten multipliceras med 100 000.

Segment: Sluten- och/eller specialiserad öppenvård Täljare: Antal vårdade patienter enligt patientregistret (sluten- och/eller specialiserad öppenvård) alkoholspecifik leversjukdom som huvuddiagnos Nämnare: Medelbefolkningen 15 år och äldre under 2021. Kvoten multipliceras med 100 000.

Statistiken är åldersstandardiserad med rikets medelbefolkning 2021 som standardpopulation. Indikatorn redovisas per kalenderår på riks- och länsnivå (län efter patientens folkbokföringsort vid första vårdtillfället med aktuell diagnos) samt efter kön och åldersgrupp.

### **Svarsfrekvens:**

Patientregistret Den årliga underrapporteringen under de senaste åren uppskattas till mindre än 1 % beträffande somatisk slutenvård. Personnumret saknas eller är felaktigt för knappt 1 % av vårdtillfällena de senaste åren, varav merparten avser barn eller utomlands boende. Huvuddiagnos saknas för cirka 1 % av vårdtillfällena. Uppgift om yttre orsak saknas sedan år 2006 för omkring 3 % av vårdtillfällena. Variabler som sjukhus, klinik, kön, ålder, in- och utskrivningsdatum är så gott som kompletta.

### **Jämförbarhet över tid**

Indikatorn är jämförbar över tid.

Segmentet Slutenvård redovisas från och med år 2000 medan segmentet Sluten- och/eller specialiserad öppenvård redovisas först från och med år 2006.

Observera att nollor (0) redovisas för segmentet Sluten- och/eller specialiserad öppenvård för åldersgruppen 16–84 år under åren 2000–2005. Dessa värden ska betraktas som missing.