



Folkhälsomyndigheten

## Indikatorbeskrivning

Vårdade, återinskrivning narkotikadiagnoser

Datum: 2025-07-14

### Indikatoruppgifter

<b>Indikatornamn:</b>	Vårdade, återinskrivning narkotikadiagnoser
<b>Indikatoransvarig myndighet/organisation:</b>	Socialstyrelsen
<b>Indikatortyp:</b>	Utfallsindikator
<b>Redovisningsnivå:</b>	Riket, Län

### Källa

<b>Namn på undersökning:</b>	Patientregistret
<b>Ansvarig myndighet/organisation:</b>	Socialstyrelsen

### Beskrivning av register/undersökning:

Patientregistret innehåller: – alla avslutade vårdtillfällen i slutenvård – uppgifter om patienter som varit inlagda på sjukhus i den geriatrika och psykiatriska vården – uppgifter om patienter som behandlats av läkare i den delen av den öppna vården som inte är primärvård – diagnoser och åtgärder för patienter som vårdats i psykiatrisk tvångsvård enligt LPT eller LRV.

Patientregistret innehåller inte: – uppgifter om primärvård – uppgifter om andra yrkesgrupper än läkare.

## Metodbeskrivning

### Indikatordefinition:

Andel (%) patienter som vårdats för narkotikadiagnos (huvud- eller bidiagnos) enligt patientregistret (slutenvård) som återinskrivits med narkotikadiagnos samma kalenderår (ICD-10: F11–F16, F18, F19, O35.5, P04.4, T40, T43.6, Z50.3, Z71.5, Z72.2) bland personer 15 år och äldre. Indikatorn redovisas per kalenderår på riks- och länsnivå samt efter kön och åldersgrupp. För en mer utförlig beskrivning av indikatorn, se 'Indikatorbeskrivning'.

### Specifikation av variabler:

Återinskrivning narkotikadiagnoser Diagnoser enligt ICD-10. Denna indikator inkluderar diagnoskoderna F11–F16, F18, F19, O35.5, P04.4, T40, T43.6, Z50.3, Z71.5 respektive Z72.2, vilka specificeras nedan:

F11 – psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider F12 – psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis F13 – psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika F14 – psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain F15 – psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein F16 – psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener F18 – psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel F19 – psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser O35.5 – vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret av läkemedel P04.4 – foster och nyfödd som påverkats av bruk av tillvänjande droger hos modern T40 – förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel (hallucinogener) T43.6 – förgiftning med psykostimulantia med missbruksrisk Z50.3 – rehabilitering av läkemedelsmissbrukare Z71.5 – rådgivning och kontroll vid drogmissbruk Z72.2 – drogbruk som livsstilsproblem.

ICD står för International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems och ICD-10 är en internationell sjukdomsklassifikation bestående av diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker med syfte att möjliggöra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen går under beteckningen ICD-10-SE.

Se Socialstyrelsens hemsida för mer information om diagnoskoder (ICD-10): <https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/icd-10/>

### **Beskrivning av beräkning:**

Täljare: Antal patienter med minst två vårdtillfällen i slutenvård under samma kalenderår med minst en av aktuella diagnoser som huvud- eller bidiagnos. Nämnare: Antal patienter med minst ett vårdtillfälle i slutenvård med minst en av aktuella diagnoser som huvud- eller bidiagnos.

På länsnivå är antalet patienter med aktuell diagnos få för vissa ålders- och könsgupper. I dessa fall ger en förändring med en patient med minst två vårdtillfällen i slutenvård under samma kalenderår med minst en av aktuella diagnoser som huvud- eller bidiagnos en stor procentuell skillnad (kvoter är känsliga för små förändringar i täljaren när nämnaren utgörs av ett litet tal). På grund av detta redovisas inte några siffror i de fall där nämnaren understiger 20 patienter.

Indikatorn redovisas per kalenderår på riks- och länsnivå (län efter patientens folkbokföringsort vid första vårdtillfället med aktuell diagnos) samt efter kön och åldersgrupp.

### **Svarsfrekvens:**

Patientregistret Den årliga underrapporteringen under de senaste åren uppskattas till mindre än 1 % beträffande somatisk slutenvård. Personnumret saknas eller är felaktigt för knappt 1 % av vårdtillfällena de senaste åren, varav merparten avser barn eller utomlands boende. Huvuddiagnos saknas för cirka 1 % av vårdtillfällena. Uppgift om yttre orsak saknas sedan år 2006 för omkring 3 % av vårdtillfällena. Variabler som sjukhus, klinik, kön, ålder, in- och utskrivningsdatum är så gott som kompletta.

### **Jämförbarhet över tid**

Indikatorn är jämförbar över tid.